

UN NOUVEAU LITSEA (LAURACEÆ) DE NOUVELLE-CALÉDONIE

A. G. J. H. KOSTERMANS¹

KOSTERMANS A. J. G. H. — 08.09.1977. Un nouveau *Litsea* (Lauraceæ) de Nouvelle-Calédonie, *Adansonia*, ser. 2, 17 (1) : 95. Paris. ISSN 0001-804X.

RÉSUMÉ : Description d'une nouvelle espèce de *Litsea* de la Nouvelle-Calédonie.

ABSTRACT : Description of a new *Litsea* from New Caledonia.

A. J. G. H. Kostermans, Herbarium Bogoriense, Djalan Raya Juanda 22-24, Bogor, Indonésie.

Litsea mackeei Kostermans, sp. nov.

— ? *Endiandra*, GUILLAUMIN, Mém. Mus. nat. Hist. nat., ser. B, 8 : 171 (1950).

Arbuscula, ramulis hornotinis minutissime pulverulente pilosis, foliis oppositis, rigide coriaceis, glabris, oblongis, obtusis basin versus attenuatis, acutis, utrinque levibus, supra nervis deest, subtus nervo mediano prominulis, nervis erecto-patentibus gracillimis non prominentibus, prope marginem arcuato-conjunctis, petiolis sat crassis; inflorescentiis axillaribus, minutissime pulverulente pilosis, pedunculis communibus sat crassis, ramulis decussatis in bractearum axillis, floribus ignotis.

TYPUS : *MacKee* 5463 (holo-, P; iso-, L).

Arbuste haut de 1 m; ramifications raides, grêles, à pubescence pulvérulente. Feuilles opposées, très coriaces, glabres, oblongues ou sub-spatulées, de 0,8 × 2,5 à 1,5 × 3,5 cm, obtuses, effilées vers la base aiguë, lisses sur les deux faces; nervures totalement invisibles à la face supérieure, à la face inférieure nervure médiane légèrement proéminente, 5-6 paires de nervures secondaires très grêles, non proéminentes, formant un angle de 45° avec la nervure médiane, et réunies en arceaux près de la marge; pétioles épais, longs de 2-4 mm.

Inflorescences axillaires, assez denses, à pubescence pulvérulente, composées d'un pédoncule principal plutôt épais, portant des bractées décussées qui axillent chacune une ramification. Boutons floraux trop jeunes pour être analysés.

NOTE : la forme des feuilles ressemble à celle de *Litsea paouensis* Guill., mais elles sont complètement lisses.

NOUVELLE-CALÉDONIE : *MacKee* 5463, Tinip, Ouaco à Gomen, alt. 10 m, boutons oct. (holo-, P).

I. Krukoff botanist, Rijksherbarium, Leiden, The Netherlands.